

## NOUVEAUX MALACODERMES EXOTIQUES (1) [Col.]

PAR

M. PIC

*Calochromus tibialis* n. sp.

*Elongatus, subparallelus, nitidus, nigro-violaceus, thorace, scutello, femoribus elytrisque ad basin breve testaceis; tibiis sulcatis; elytris costulatis.*

Allongé, subparallèle, brillant, noir violacé avec le prothorax, les cuisses, l'écusson et l'extrême base des élytres testacés. Tête petite, impressionnée entre les yeux; antennes longues, un peu épaissies à la base, foncées, avec le premier article vaguement marqué de roux à la base: prothorax court, peu élargi en arrière, impressionnée près de chaque angle; élytres un peu plus larges que le prothorax, à peine élargis avant le milieu et rétrécis ensuite, costulés, d'un noir violacé avec l'extrême base, y compris les épaules, testacées; pattes pas très longues, cuisses testacées, tibias foncés un peu aplatis et sillonnés, les antérieurs en outre étant faiblement arqués. Long. 10 millim., îles Salomon.

Très voisin de *C. humeralis* Pic: en diffère, à première vue, par la coloration testacée moins étendue sur la base des élytres et par toutes les cuisses entièrement testacées.

*Chauliognathus albithorax* n. sp.

*Elongatus, parum nitidus, niger, antennis palpisque pro majore parte rufescentibus, thorace abdomineque albo testaceis.*

Allongé, peu brillant, noir, base des palpes et antennes, moins les 1<sup>ers</sup> articles, foncés, roussâtres, abdomen et prothorax d'un blanc testacé. Tête pas très large, impressionnée sur le vertex; antennes assez longues et grêles avec le 1<sup>er</sup> article peu épaissi; prothorax luisant et de coloration pâle, presque carré, plus étroit que les élytres; élytres pas très larges et assez longs, atténués en arrière, un peu brillants à la base, subopaques et

(1) Toutes les nouveautés figurent dans la collection Maurice Pic.

à vague transparence brune en arrière; abdomen testacé, plus pâle à la base, cupuliforme au sommet; pattes foncées, à pubescence claire, un peu robustes. Long. 15 millim. Nouvelle-Guinée.

Cette espèce, voisine de *C. Le Moulti* Pie, est très distincte par la coloration foncée des élytres qui, en outre, sont plus densément ponctués postérieurement.

*Chauliognathus Lajoyei* n. sp.

*Satis robustus, postice valde attenuatus, parum nitidus, niger, thorace rubro, nigro maculato, satis elongato; elytris brevibus, postice valde attenuatis et dehiscentibus, abdomine, apice excepto, luteo marginato.*

Assez robuste, très atténué en arrière, avec les élytres longuement déhiscents, peu brillant, noir avec le prothorax rouge, maculé de noir de la façon suivante : une macule médiane transversale sur le bord antérieur et une autre sur le milieu, deux macules distantes à la base. Tête longue : prothorax un peu plus long que large, relevé sur les bords, presque droit sur les côtés; élytres nettement plus larges que le prothorax à la base, assez courts, très atténués et déhiscents à l'extrémité; abdomen foncé, marginé, à l'exception du sommet, de jaune, dernier segment sinué à l'extrémité; pattes robustes, les postérieures plus longues avec les tibias subsinuées. Long. 12 millim. Amérique méridionale : Montevideo (ex coll. LAJOYE).

Voisin de *Ch. Schuppeli* Bourg., pattes plus longues et coloration très différente.

*Dasytes Armitagei* n. sp.

*Elongatus et angustatus, nitidus, griseo pubescens, antice fusco hirsutus, nigro-viridescens, antennis ad basin, pedibus thoraceque lateraliter testaceis.*

Allongé et étroit, orné d'une pubescence grise, écartée, avec des poils foncés dressés sur l'avant-corps, brillant, noir verdâtre, antennes à la base, pattes et côtés du prothorax testacés. Tête assez grosse, biimpressionnée entre les yeux; antennes robustes, testacées à la base, rembrunies ensuite; prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant, à ponctuation très forte et écartée sur le disque; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, à peine élargis après le milieu puis courtement

rétrécis à l'extrémité, à ponctuation écartée, moins forte vers l'extrémité; pattes médiocres. Long. 4 millim., Amérique méridionale : Bogota (ex coll. ARMITAGE).

Voisin de *D. Baeri* Pic, mais élytres moins larges par rapport au prothorax, ce dernier étant moins rétréci aux extrémités et testacé sur les côtés.

*Dasytes aplocnemiformis* n. sp.

*Satis latus et convexus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, nigro-aeneus, antennis pedibusque pro parte rufescentibus.*

Assez large et convexe, brillant, orné de longs poils gris, en partie redressés, noir bronzé avec les pattes et antennes en partie et variablement roussâtres. Tête large, à ponctuation pupilleuse; antennes plus ou moins rousses, à base obscurcie, courtes avec les derniers articles élargis; prothorax presque de la largeur des élytres, court, subarqué sur les côtés, rétréci en avant, à ponctuation en partie pupilleuse; élytres assez larges et peu longs, surtout ♀, courtement atténués au sommet, rebordés sur les côtés et à la suture, à ponctuation forte et rapprochée avec des petites rides transversales; pattes robustes, variablement et en partie roussâtres avec les farses d'ordinaire de coloration plus claire. Long. 4-4,3 millim., Indes : Khasia Hills.

Cette espèce, très distincte par son faciès qui rappelle les espèces du genre *Aplocnemus* Steph., peut prendre place provisoirement près de *D. discretus* Gorb.

---